

Cudurka *Borrelia miyamotoi*

Waa maxay cudurka *Borrelia miyamotoi*?

Cudurka *Borrelia miyamotoi* waa mid ka mid ah cudurada shilinta laga qaado ee Minnesota. Cudur siduhu wuxuu si dhaw ula xidhiidhaa bakteeriyyada keenta xumadda ka-sii-darista takfidu keento waxayna si fog ula xidhiidhaa bakteeriyyada keenta cudurka Lyme. Waxaa markii ugu horraysay loo aqoonsaday inay sabab u tahay jirro bini'aadan sanadkii 2011-kii iyada oo kiiskii ugu horreeyay laga soo sheegay qof Minnesota deggan 2016. Tan iyo markaas, tiro yar oo xaalado ah ayaa laga soo sheegaa Minnesota sanad walba.

Sidee bay dadku ku qaadaan cudurka *Borrelia miyamotoi*?

Dadku waxay ku qaadaan cudurka *B. Miyamotoi* inta ugu badan qaniinyada shilinta lugaha madow (deer tick) taasi oo caabuqa bakteeriyyadu uu hayo. Dhammaan shilinta lugaha madow ma sidaan bakteeriyyadan, dhammaan dadka ay qaniinto shilinta lugaha madowna ma bukoodaan. Shilintu waxay u baahan tahay inay qofka ku dhagganaato muddo kahor inta ayna cudurka keenin. Inkastoo muddada ugu yar aan la ogaan karin *B. Miyamotoi*, cududr sidha waxa lagu gudbin karaa 24-ka saac ee u horreeya ee qabsashada shilinta.

Shilinta lugaha madow waxay ku nooshahay dhulka meelaha dhirta leh ama meelaha kaynta badan leh. Shilintu waxay ka raadsataa wax ay ku dul noolaato heirka ama heir u dhaw waxayna qabsataa marka qof ama xayawaan meesha soo maraan. Shilintu ma booddo, duusho ama kama soo dhacdo geedaha.

Gobolka Minnesota, bilaha Abril ilaa Luulyo iyo Sebtembar ilaa Oktoobar ayaa ah kuwa khatarta ugu wayn ee in shilintu qofka qaniinto. Khatartu

waxay cirka gaadhaa Juunyo ama Luulyo sanad kasta. Shilinta lugaha madow waa wax yaryar; kuwa qaangaarka ah waxay la xajmi yihiin siidhka sisinta kuwa carruurta ahna waxay la xajmi yihiin siidhka bobiga. Iyadoo ay ugu wakan tahay xajmigooda yar, qofku ma ogaan karo in shilin qaniinsan tahay.

Maxay yihiin astaamaha cudurka *Borrelia miyamotoi*?

Baaxadda jirrada wali waa la sharxaya cudurkan cusub. Hase yeeshay, astaamaha ugu caansan ee la soo sheegay ilaa hadda waxaa ka mid ah:

- **Qandho ama qarqaryo**
- **Madax-xanuun**
- **Murqo xanuun**
- **Daal ama daciifnimo**

Si la mid ah xumadda ka sii darta ee shilinta laga qaado, qaar kamid ah bukaanada u buka *B. Miyamotoi* waxay ku tilmaameen calaamadaha soo noqnoqda kahor inta aan la ogaanin iyo daawaynta. Xanuun daran oo saameeya nidaamka dareemayaasha, sida meningoensephalitis (caabuqa maskaxda iyo xuubyada ku wareegsan maskaxda), ayaa sidoo kale la soo sheegay.

Sidee cudurka *Borrelia miyamotoi* loo ogaadaa?

Haddii qofku tuhmo inuu qabo cudurka *B. Miyamotoi* waa inay la xiriiraan dhakhtarka sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah looga baaro loogana daaweyyo. Baaristu waxay kusalaysan tahay taariikhda gaadhista deegaan shilintu joogto, baaris jireed, iyo tijaabooyin shaybaar si loo xaqijiyo waxa qofka haya.

Sidee cudurka *Borrelia miyamotoi* loo daaweyaa?

Cudurka *Borrelia miyamotoi* waxa lagu daaweyaa antibayootik. Waxay u badan tahay inaad qaaddo cudurkan shilintu qaaddo markaa sii wad si aad uga ilaalso naftaada qaniinyada shilinta oo la xidhiidh dhakhtarkaaga haddii aad tuhunto inaad leedahay astaamaha cudurka *B. Miyamotoi*.

Sidee baan u yarayn karaa khatartayda?

Wakhtigan ma jiraan wax tallaal ah oo bani aadaka loo heli karo cudurka *B. Miyamotoi*. Yaraynta gaadhista meelaha shilintu joogto ayaa ha difaaca ugu fiican ee ka dhanka ah cudurka shilinta laga qaado.

Iska ilaali qaniinyada shilinta:

- Ogow meesha ay shilintu ku nooshahay iyo marka ay firfircooni yihii.
 - Shilinta lugaha madow waxay ku nooshahay aagagga geedaha waawayn ama kaynta leh.
 - Gobolka Minnesota, firfircoonia shilinta lugaha madow waxay ugu firfircooni tahay laga bilaabo Abriil -- Luulyo iyo Sebtembar -- Oktoobar.
- Isticmaal celiye shilin oo ammaan ah iyo wax-ku-ool ah haddii aad joogto aagagga ama agagaarka meelaha shilintu ku nooshahay. Raac tilmaamaha waxsoosaarka oo dib ugu isticmaal sida la tilmaamay.
 - Isticmaal **celiyayaasha DEET** (ila 30%) maqaarka ama dharka. Ha u isticmaalin DEET dhallaanka ka yar da'da laba bilood.
 - Hore ugu sii daawee dharka iyo qalabka **celiyayaasha permethrin** kusalaysan si aad iskaga ilaalso qaniinyada shilinta muddo ugu yaraan ah laba toddobaad adiga oo mar labaad isticmaalin. Ha u isticmaalin permethrin maqaarkaaga.

- Xiro dhar iftiin leh oo kaa caawiya inaad si dhib yar u aragto shilinta. Xiro shaadh iyo surwaal dheer si aad u daboosho maqaarkaaga.
- Ku dhaq dharka qallalan iyo qalabka kul sare ugu yaraan 60 daqiiqo kadib markii aad wakhti ku soo qaadatay aagag ay shilini ku nooshahay.
- Kala hadal dhakhtarkaaga xoolaha wax ku saabsan waxsoosaarka ammaanka iyo wax-ku-oolka ah ee aad isticmaali karto si aad u ilaalso rabbaayaddaada.

Hubi shilinta ugu yaraan halmar maalintii kadib markaad wakhti ku qaadato meelaha ay shilintu ku nooshahay.

- Jirkaaga oo idil si dhaw ugu baadh muraayad, gaar ahaan meelaha ay adag tahay in la arko sida bisqinta iyo kilkisha.
- Soo goo shilinta isla marka aad aragto.
- Isticmaal birqabadyo ama farahaaga si aad shilinta u qabato meel afkeeda u dhaw. Si tartiib ah u soo goo shilinta. Ku nadifi aagga saabuun iyo biyo.
- Ka baar qalabkaaga iyo rabbaayadahaaga shilin.

Maaree meelaha ay shilintu ku nool yihii:

- Xaaq cawshka iyo dhabbooyinkana bannee si joogto ah.
- Googoo caleemaha iyo kaynta.
- Ka samee gidaar ah qoryo ama dhagaxaan halka u dhaxaysa cawska iyo looxaanta la googooyey.

Minnesota Department of Health
Vectorborne Diseases Unit
PO Box 64975
St. Paul, MN 55164
651-201-5414
www.health.state.mn.us

Borrelia miyamotoi Disease – Somali (4/11/19)

Si aad ugu hesho macluumaadkan qaab kale, wac 651-201-5414. Waxaa lagu daabacay warqad dib loo warshadeeyey.